

EVIDENCE-BASED PRACTICE POSITION STATEMENTS

"Bij zuigelingen behoren manipulatie- en mobilisatietechnieken van de wervelkolom niet te worden uitgevoerd. Bij kinderen behoren manipulatietechnieken van de nek en de lage rug niet te worden uitgevoerd."

"Bij adolescenten kunnen manipulatie en mobilisatie van de wervelkolom passend zijn voor de behandeling van musculoskeletale klachten."

"Manipulatie en mobilisatie van de wervelkolom zijn niet passend en zouden niet moeten worden uitgevoerd bij zuigelingen, kinderen en adolescenten voor de behandeling van niet-musculoskeletale aandoeningen."

Directive	EVIDENCE-BASED PRACTICE POSITION STATEMENTS
NIET AANBEVOLEN (niet uitvoeren)	• Manipulatie en mobilisatie van de wervelkolom behoren niet te worden uitgevoerd bij zuigelingen. • Manipulatie van de cervicale- en lumbale wervelkolom behoort niet te worden uitgevoerd bij kinderen. • Manipulatie en mobilisatie van de wervelkolom zijn niet geschikt en behoren niet te worden uitgevoerd voor de behandeling van niet-musculoskeletale aandoeningen bij zuigelingen, kinderen en adolescenten, waaronder astma, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), autismespectrumstoornis, borstvoedingsproblemen, cerebrale parese, darmkrampjes bij zuigelingen, nachtelijk bedplassen en middenoorontsteking.
Mogelijk PASSEND met de juiste klinische redenering	• Mobilisatie van de wervelkolom kan passend zijn voor de behandeling van kinderen met musculoskeletale aandoeningen, waaronder mobiliteitsbeperkingen in verband met nek- en rugpijn, en nekpijn met hoofdpijn. • Manipulatie van de thoracale wervelkolom kan passend zijn voor de behandeling van kinderen met musculoskeletale aandoeningen, waaronder beperkingen in verband met nek- en rugpijn. • Manipulatie en mobilisatie van de wervelkolom kunnen passend zijn voor de behandeling van adolescenten met musculoskeletale aandoeningen, waaronder beperkingen in de mobiliteit van de wervelkolom in verband met nek- en rugpijn en nek- en hoofdpijn.
AANBEVOLEN	• Er is geen bewijs met hoge zekerheid beschikbaar om manipulatie of mobilisatie van de wervelkolom aan te bevelen voor pediatrische populaties.